

Informations à transmettre dans les délais les plus brefs à l'équipe du LIFE au 07.60.26.69.65 ou 06.14.82.15.17.

- Téléphone .....
- E-mail .....
- Adresse .....

### Identification de l'espèce

- Caractéristique(s) reconnue(s) d'une Érismatore rousse .....
- Niveau de certitude  
à confirmer  formel

### Conditions d'observation

- Date .....
- Heure .....

### Nature de l'observation

- Posé(s)  En vol
- Isolé(s)  En groupe
- Mêlé(s) à d'autres oiseaux d'eau
- Quelles espèces (combien) .....

### Nombre d'oiseaux observés

- Nombre de mâles adultes .....
- Nombres de femelles adultes .....
- Nombre de nichées .....
- Nombre de jeunes par nichée .....

### Autres informations utiles

Complément d'informations permettant d'aider à la localisation, personne à contacter pour l'accès au site

L'Office Français de la Biodiversité est un établissement public de l'État, placé sous la double tutelle des Ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture.



La Société Nationale de Protection de la Nature une association loi de 1901, fondée en 1854, reconnue d'utilité publique depuis 1855, qui participe à la sauvegarde de la biodiversité. Sa mission est la protection des espaces et des espèces sauvages, en s'appuyant sur les fondements scientifiques de l'écologie et de la biologie de la conservation.



Depuis 1996, l'OFB (anciennement ONCFS) organise la lutte contre l'Érismatore rousse sur tout le territoire national pour le compte de l'État. Cette action s'est vue renforcée en 2015 par la conception et la mise en œuvre d'un nouveau plan national de lutte établi jusqu'en 2025.

En octobre 2018, ce dispositif a obtenu le soutien de l'Europe avec l'obtention du projet LIFE Oxyura. Ce soutien bénéficie aux deux partenaires, l'OFB et la SNPN. Ce projet a pour but de contrôler la population captive et d'atteindre une absence de reproduction en milieu naturel en 5 ans.

Direction générale OFB :  
12 Cours Louis Lumière-94300 VINCENNES  
Tel : +33 2 98 33 87 67



# ENSEMBLE, contribuons à contrôler les populations d'Érismatore rousse



## L'Érismature rousse en France

L'Érismature rousse (*Oxyura jamaicensis*) est un petit canard d'origine nord américaine. Elle s'est acclimatée en milieu naturel en 1953 en Grande-Bretagne à partir d'individus échappés de parcs zoologiques. Elle s'est depuis propagée dans plusieurs pays d'Europe, notamment en France dès 1974 et en Espagne dès 1983, où vit la dernière population ouest-européenne d'Érismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) depuis sa disparition de Corse en 1966.

## Sa gestion en faveur de la biodiversité

Très vulnérable et menacée à l'échelle mondiale, l'Érismature à tête blanche fait l'objet d'importantes mesures de conservation.

L'Érismature rousse représente une menace supplémentaire pour l'Érismature à tête blanche car elle l'exclut des sites d'alimentation et elle s'hybride avec elle. Leur descendance étant féconde, le risque de disparition de l'Érismature à tête blanche par « dilution génétique » est réel.

Dans ce contexte, des mesures drastiques ont été prises au niveau international pour lutter contre l'expansion des populations d'Érismatures rousses : - la résolution 4.3, de septembre 2008, de l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) recommande fortement à la France de mettre en place ou d'intensifier des mesures d'éradication complémentaires en vue de prévenir la propagation de l'espèce sur le continent européen et ayant pour objectif son éradication totale dans la zone de l'Accord ;

- la recommandation 149 (2010) adoptée par la Convention de Berne demande aux pays signataires de mettre en œuvre le nouveau Plan d'action réclamant l'éradication de l'Érismature rousse dans le milieu naturel d'ici 2015 et, pour la France en particulier, une intensification des efforts actuels et la mise en œuvre d'une importante campagne de sensibilisation.

La France, située dans une position « charnière » entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, a une responsabilité importante pour empêcher l'expansion géographique de l'Érismature rousse dans le paléarctique occidental.

## Contribuons à sa limitation

Pour que la France puisse respecter ses engagements internationaux, une étroite collaboration entre l'ensemble des observateurs de terrain et les services départementaux de l'OFB doit être mise en place. Dans le cadre du plan national de lutte contre l'Érismature rousse, des réseaux départementaux de spécialistes formés au tir sélectif, animés par les services départementaux de l'OFB, renforcent dans les départements concernés le système national de lutte déjà existant.

Toute observation d'Érismature rousse doit être signalée à l'équipe du LIFE OXYURA au 07.60.26.69.65 dans les plus brefs délais (<https://ob.gouv.fr/le-oxyura/>).

L'animateur OFB du réseau départemental prendra les mesures nécessaires pour prélever les spécimens identifiés.

Les pages suivantes permettent de différencier les Érismatures rousses et les Érismatures à tête blanche.

## ENSEMBLE,

limitons son expansion

### Reconnaitre l'Érismature rousse



Chez les deux sexes, le bec de l'Érismature rousse n'a pas de protubérance à la base et a un profil concave.

Le mâle a une dominante rousse du plumage et le bec bleu lors du plumage nuptial, et gris dans les autres plumages. La tête est noire et blanche, parfois toute noire.

La femelle a une robe générale marron ainsi que la tête avec la moitié supérieure marron foncé et celle inférieure marron clair, barrée de sombre.

Durant les parades nuptiales, les mâles provoquent un bouillonnement de l'eau et se frappent maintes fois la poitrine avec le bec.

Les plumes sous-caudales sont blanches.

Les jeunes ont une silhouette proche des jeunes fuligules milouins (avec qui ils peuvent être confondus). Ils ont également un profil semblable à celui de la femelle. Ils portent un bandeau latéral.

### Reconnaitre l'Érismature à tête blanche



Le bec de l'Érismature à tête blanche est gros, busqué (type convexe) et a une protubérance à la base chez les deux sexes.

Chez le mâle, la poitrine est rousse et la face est blanche, presque entièrement au stade adulte, avec cependant le dessus noir. Le bec est bleu durant le plumage nuptial et gris dans les autres plumages.

La femelle est semblable à celle de l'Érismature rousse mais les teintes de la tête semblent plus contrastées.

Durant les parades nuptiales, les mâles adoptent une nage latérale avec bruit de crécelle, coups de pattes, vocalisations et vibrations de la queue.

Les plumes sous-caudales peuvent prendre différentes tonalités allant de l'ocre au marron.

## ENSEMBLE,

contribuons à la conservation de l'Érismature à tête blanche dans la paléarctique occidentale